



КЛЕЩИ

Как защититься от них на частных подворьях и дачных участках?

В период полевых работ, с мая по октябрь, для дачников и владельцев приусадебных участков существует определенная опасность заражения инфекционными заболеваниями, такими как клещевой энцефалит, Лайм боррелиоз, риккетсиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и др.

Основными хранителями возбудителей этих инфекций в природе и переносчиками их человеку являются клещи и мышевидные грызуны. Из леса, парка, сквера, с берегов рек, озер, прудов в поисках благоприятных кормовых и микроклиматических условий они устремляются к жилищу человека, в дачные кооперативы, к пастбищам домашних животных, в районы свалок мусора и органических отходов. Клещи на участок могут быть занесены зайцами, куропатками, куницами, лисицами.



Заражение этими инфекциями происходит чаще всего при укусе клеща. Вирусом клещевого энцефалита можно также заразиться при употреблении молока коз, в редких случаях - молока коров.

Защищайтесь правильно!

1. Прежде всего, благоустройте территорию: очистите от бытового мусора, растительных остатков, валежника и содержите ее в чистоте и порядке. Постоянно скашивайте траву.
2. Весной и осенью проводите мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами (разложите приманки в местах, недоступных для домашних животных).
3. Для уничтожения клещей можно провести обработку территории инсектоакарицидами или заказать профессиональную обработку в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии (эффективность обработки сохраняется до 45 дней).

Обработка территории для предотвращения заноса клещей проводится по ее периметру, на тропинках, ведущих к участку, в барьерной зоне.

Исключено попадание средства на участки, предназначенные для выращивания плодово-ягодных и овощных культур, на емкости с водой.

Недопустимо нахождение детей на обработанных участках.

ПОМНИТЕ о мерах личной безопасности!

1. Одевайтесь для работы в саду, огороде в светлую одежду, чтобы был заметен ползущий клещ.
2. Обрабатывайте одежду акарицидными и акарицидно-репеллентными препаратами.
3. Проводите само- и взаимоосмотры каждые 15-20 минут.
4. Осматривайте домашних животных.
5. Козье молоко пейте только в кипяченом виде.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если клещ присосался?

- Присосавшегося клеща нужно самостоятельно удалить ниткой, завязанной у хоботка, или пинцетом. Покачивая головку клеща со стороны в сторону, или, повернув его против часовой стрелки, выдернуть. Нежелательно смазывать клеща разными маслами. Место укуса после извлечения клеща нужно прижечь йодом или другим спиртосодержащим раствором и тщательно вымыть руки с хозяйственным мылом.
- Снятого и сохраненного во флаконе с влажным кусочком марли или ваты клеща можно в течение 2-х недель исследовать на наличие возбудителей клещевых инфекций в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии в Бресте, Пинске и Барановичах.
- При появлении любого недомогания после укуса клеща незамедлительно следует обратиться к врачу-терапевту или врачу-инфекционисту.



Энтомолог Попчева О.М.